

Ueber
einige Condensationsproducte
des
Pseudocumylhydrazins.

Inaugural-Dissertation
der
hohen philosophischen Facultät der Universität Rostock
zur
Erlangung der Doctorwürde
vorgelegt
von
Curt Kessler
aus Magdeburg.

Magdeburg.
Buchdruckerei von C. Pormetter.
1892.

Ueber
einige Condensationsproducte
des
Pseudocumylhydrazins.

Inaugural-Dissertation
der
hohen philosophischen Facultät der Universität Rostock
zur
Erlangung der Doctorwürde
vorgelegt
von
Curt Kessler
aus Magdeburg.

Magdeburg.
Buchdruckerei von C. Pormetter.
1892.

Referent:
Professor Dr. **Michaelis.**

Seinen lieben Eltern

in Dankbarkeit

gewidmet

vom Verfasser.

Vorliegende Arbeit wurde in dem chemischen Laboratorium der Landesuniversität zu Rostock auf Veranlassung des Herrn Professor Dr. A. Michaelis ausgeführt.

Mit Freuden komme ich der angenehmen Pflicht nach, diesem, meinem hochverehrten Lehrer, für seine wirksame Unterstützung in Rath und That an dieser Stelle meinen wärmsten Dank auszusprechen.

Rostock, im August 1892.

Der Verfasser.

Einleitung.

Eine der reaktionsfähigsten Verbindungen der organischen Chemie ist das im Jahre 1878 entdeckte Phenylhydrazin. Es wurde zuerst von E. Fischer ¹⁾ aus der Diazobenzolsulfonsäure dargestellt, welche er auf bekannte Weise durch Diazotirung des salzsauren Anilins mittelst salpetrigsauren Natron und Behandlung des dabei entstehenden Diazochlorides mit neutralen schwefligsauren Alkalien gewonnen hatte. Dieses diazosulfonsaure Salz giebt bei der Reduktion mit Zinkstaub in essigsaurer Lösung das hydrazinsulfonsaure Salz.


Behandelt man das letztere mit heifser konzentrierter Salzsäure, so wird die Sulfonsäuregruppe abgespalten, und es resultirt das salzsaure Phenylhydrazin. Die Reaktionen verlaufen im Sinne folgender Gleichungen:

- 1) $C_6H_5 \cdot NH_2 \cdot HCl + Na \cdot NO_2 + HCl = C_6H_5 \cdot N = NCl + Na \cdot Cl + 2 aq,$
- 2) $C_6H_5N = NCl + Na_2SO_3 = C_6H_5 \cdot N = NSO_3Na + Na \cdot Cl.$
- 3) $C_6H_5N = NSO_3Na + H_2 = C_6H_5 \cdot NH - NH \cdot SO_3Na$ und
- 4) $C_6H_5 \cdot NH - NH \cdot SO_3Na + H \cdot Cl + H_2O = C_6H_5 \cdot NH - NH_2 \cdot HCl + Na \cdot HSO_4.$


Eine andere Methode, mittelst welcher das Phenylhydrazin dargestellt wurde, ist die unter Umständen bequemere

¹⁾ Annalen f. Ch. u. Ph. 190, pag. 67.

und schneller ausführbarere von V. Meyer und Lecco¹⁾. Dieselben reduzierten die Diazochloridlösung sofort zum salzsauren Phenylhydrazin unter Anwendung von Zinnchlorür in konzentrierter Salzsäure nach folgendem Schema:



Eine dritte Methode zur Hydrazindarstellung, bei der jedoch nur sekundäre Hydrazine entstehen, ist noch bekannt, nämlich die Reduktion der aromatischen Nitrosamine:



Letztere Körper erhält man jedoch weit besser durch Vermittlung von Alkylbromiden auf das von A. Michaelis²⁾ zuerst dargestellte Natriumphenylhydrazin: $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}\cdot\text{Na} - \text{NH}_2$.

Die beiden ersten Methoden von Fischer und Meyer bewähren sich bei der Herstellung des Phenylhydrazins gleich gut; bei den homologen Gliedern ist bald die eine, bald die andere Methode vortheilhafter in Bezug auf die Ausbeute. Bei einzelnen Gliedern der aromatischen Reihe ist das eine oder andere Verfahren geradezu unbrauchbar. So läßt sich z. B. das Naphtylhydrazin nur nach V. Meyer's und Lecco's, das Pseudocumylhydrazin nur nach E. Fischer's Vorschrift bereiten.

Bei noch anderen, wie z. B. bei dem hypothetischen Hydrazin aus Mesidin, führt weder die eine Reduktion, noch die andere zum Ziel, trotzdem sich das Diazochlorid³⁾ wirklich bildet.

¹⁾ Berichte 16, S. 2976.

²⁾ Berichte 19, S. 2448.

³⁾ Dafs sich das Diazochlorid des Mesitylens bildet, geht nicht nur aus der Färbung des salzsauren Mesidins beim Diazotiren hervor, sondern ganz sicher aus einer mir von R. Eckel mitgetheilten Reaktion, nach welcher er vermöge der Einwirkung von Jod- oder Bromkalium auf das Diazomesitylenchlorid bei mäßiger Temperatursteigerung die Halogene in den Mesitylenring einführte. (Sandmeyer.) —

Das Phenylhydrazin und seine Homologen, von welchen bisher nur o¹⁾, m²⁾ und p³⁾ = Tollyhydrazin, Cumylhydrazin, ferner Anisyl-⁴⁾ und Phenetylhydrazin⁵⁾ genauer bekannt sind, geht mit fast allen reaktionsfähigen chemischen Agentien Verbindungen ein, von denen viele in der Technik als Arzneimittel u. s. w. Verwendung gefunden haben.

Vielleicht die wichtigste aller dieser Reaktionen ist die Condensation mit Aldehyden und Ketonen zu Hydrazonen unter Austritt von Wasser, da sie ein gutes Mittel an die Hand giebt, sowohl die Aldehyde und Ketone, wie auch die Hydrazine selbst als solche nachzuweisen und zu identifiziren. Diese Aldehyd- und Ketonhydrazone lassen sich durch Ammoniakabspaltung weiter in Alkylindole verwandeln.

Mit Säurechloriden und -Anhydriden setzt sich das Hydrazin zu den sog. Hydraziden um, von durchweg größerer Beständigkeit.

Mit den Estern der Isocyansäure und Isosulfocycansäure entstehen Harnstoff resp. Thioharnstoff ähnliche Körper.

Die Hydrazone der ungesättigten Aldehyde und Ketone geben bei ihrer Destillation in Folge molekularer Umlagerung Pyrazolinabkömmlinge.

Mit Acetessigester bilden sich Pyrazolone oder anti-pyrimähnliche Verbindungen.

Außer diesen beispielsweise genannten Reaktionen hat man mit dem Phenylhydrazin noch zahlreiche analoge ausgeführt. Auch von den Tollyhydrazinen sind verschiedene Derivate, allerdings nicht annähernd in der Menge bekannt. Die Phenolhydrazine sind nur eben selbst beschrieben, Derivate von ihnen sind so gut wie noch garnicht dargestellt.

¹⁾ Annalen 212, S. 338.

²⁾ Ibid. 22, S. 84.

³⁾ Berichte 9, S. 890.

⁴⁾ Reisenegger, Annal. 221, S. 314.

⁵⁾ Stolz, Ber. 25, S. 1663.

Vom Pseudocumylhydrazin kennt man nur seine Antipyrinverbindung¹⁾, erhalten durch Condensation mit Acetessigester, sowie die bei der Bildung des Hydrazins selbst entstehenden Uebergangsprodukte, deren genauere Beschreibung unten folgen soll.

Auf Veranlassung des Herrn Professor Dr. A. Michaelis unterzog ich mich einer eingehenden Untersuchung der Verbindungen des Pseudocumylhydrazins, deren Beschreibungen unten ebenfalls folgen.


¹⁾ Berichte 18, S. 708.



Experimenteller Theil.

I.

Pseudocumylhydrazin.




Darstellung: Alle Versuche, das Hydrazin nach der schnelleren Methode zur Gewinnung der Hydrazine von V. Meyer und Lecco darzustellen, nämlich durch Reduktion der Diazoverbindungen mittelst Zinnchlorür in konzentrierter Salzsäure, sind mißlungen, wie sehr auch die Agentien abgekühlt und wie verschieden die Mengeverhältnisse angewandt wurden. Es wurde deshalb die ältere Methode von E. Fischer, mittelst Reduktion der Diazosulfosäuren mit Zinkstaub in saurer Lösung, mit Hülfe deren das Hydrazin schon früher¹⁾ dargestellt wurde, benutzt.

Zu einer möglichst sorgfältig abgekühlten Lösung von 58 gr Pseudocumidin in 100 gr 40 % Salzsäure und ungefähr 180—200 gr Wasser setzt man sehr langsam und in möglichst kleinen Portionen eine Lösung von 30 gr Natriumnitrit in 60 gr Wasser. Die so entstehende gelbe Lösung

¹⁾ Ber. d. d. chem. Ges. 18, S. 91.

von Diazopseudocumylchlorid gießt man allmählich in die ebenfalls sorgfältig gekühlte, gesättigte Lösung von 240 gr krystallisirtem, neutralen schwefligsaurem Natron. Hierbei bildet sich das Natriumsalz der Sulfonsäure der Diazocumylverbindung von folgender Zusammensetzung:



Das Salz ist sehr leicht löslich in heißem Wasser, auch in Alkohol, aus dessen Lösung es durch Zusatz von Aether in feinen gelben Blättchen wieder ausgefällt werden kann. Ein durch Verdunsten der alkoholischen Lösung in derben, gelben Prismen erhaltenes Produkt wurde über Schwefelsäure im Exsikkator getrocknet und gab bei der Verbrennung folgende Zahlen:

0,2574 gr	gaben	25 cm ³ N	bei 15° und 756 mm Druck
0,2310 gr	„	0,2184 Ba·SO ₄	mit Bromwasser
0,2806 gr	„	0,1605 Na ₂ ·SO ₄	beim Abrauchen mit H ₂ ·SO ₄



Gefunden:		Berechnet:
11,34 %	N	11,20 %
12,98 %	S	12,80 %
9,26 %	Na	9,20 %

Zur weiteren Verarbeitung des diazosulfonsauren Natriums erhitzt man das gesammte Reaktionsgemisch vorsichtig auf dem Dampfbade, bis alles Salz in Lösung gegangen ist und reduzirt nun mit Zinkstaub und Eisessig, bis die gelbe Flüssigkeit farblos geworden ist. Dieselbe muß so schnell als möglich im Heißwassertrichter filtrirt werden, da das hydrazinsulfonsaure Natron, welches schwerer löslich ist als das diazosulfonsaure Salz, sich in Mengen ausscheidet, sobald sich die Lösung um wenige Grade abkühlt. Bei vorsichtig geleiteter Operation erhält man so nach dem Abkühlen des Filtrats ein schon fast weißes Rohprodukt von pseudocumylhydrazinsulfonsaurem Natron:



Dieses Salz ist schwer löslich in kaltem Alkohol und Wasser, wenngleich weniger, als das entsprechende diazo-sulfonsaure Salz. Nach mehrmaligem Umkrystallisiren aus siedendem Wasser erhält man das Produkt in grossen, seiden-glänzenden Lamellen, die Krystallwasser enthalten. Das bei 110° getrocknete Produkt gab beim Abrauchen mit konzentrirter Schwefelsäure die richtigen Zahlen. $C_9H_{13}N_2SO_3Na$.

0,1114 gr gaben 0,0634 Na_2SO_4

Berechnet für:

Gefunden:	$C_9H_{13}N_2SO_3Na$
9,15 %	Na : 9,13 %.

Von der Ausführung einer vollständigen Analyse wurde Abstand genommen, da die procentischen Unterschiede der Bestandtheile beider Salze zu gering sind, um aus den eventl. gefundenen Zahlen auf die Richtigkeit der Formeln schliessen zu können.

Das hydrazinsulfonsaure Natrium wird von der Mutterlauge befreit und in wenig siedendem Wasser gelöst; die Lösung versetzt man mit ungefähr demselben Volumen Salzsäure von 40 %. Dadurch wird der Sulfonsäurerest abgespalten, und es entsteht das salzsaure Pseudocumylhydrazin, welches sich im festen, krystallinischen Zustande ausscheidet. Es wird sorgfältig von der überschüssigen Salzsäure durch Absaugen auf Asbestpapier befreit und an der Luft auf Thontellern getrocknet. Man erhält so ein Rohprodukt, das sich sehr gut im verkorkten Glase aufbewahren läßt. Die Ausbeute ist nahezu quantitativ, selbst wenn man sehr grosse Posten mit einem Male verarbeitet; bei 400 gr Pseudocumidin als Ausgangsmaterial erhielt ich bei sorgfältig geleiteter Operation 500 gr lufttrockenes salzsaures Pseudocumylhydrazin, was einer Ausbeute von über 90 % entspricht.

Das Salz ist leicht löslich in Wasser und Alkohol. Zu einer Chlorbestimmung wurde das Rohprodukt mehrere Male aus wenig Salzsäure enthaltendem Wasser umkrystallisirt; man bekommt dann zolllange, fast farblose, Nadeln, die im

Exsikkator die Salzsäure theilweise wieder abspalten. Ein lufttrockenes Präparat gab beim Fällen mit Höllesteinlösung:

0,1730 gr gaben 0,1310 Ag.Cl

Berechnet für:

Gefunden:		$C_9H_{11}N_2H_3 \cdot HCl$
18,78 %	Cl	19,03 %

Durch Alkalien wird das freie Hydrazin aus der wässrig-alkoholischen Lösung in grossen schillernden Blättchen ausgeschieden, welche ziemlich leicht löslich sind in Alkohol, Chloroform und Aether. Aus letzterem krystallisiren sie in Nadeln vom Schmelzpunkt 120° .

So beständig das salzsaure Salz ist, so unbeständig ist die freie Base; sie verharzt an der Luft ebenso schnell, wie im evacuirten Exsikkator unter Bildung einer blasigen Masse. Auf eine Analyse mußte daher Verzicht geleistet werden.

Es mag noch Erwähnung finden, dafs sich das schwefelsaure und salpetersaure Salz dem salzsauren ganz analog verhalten.

Man gewinnt sie, indem man die in Aether aufgenommene freie Base mit der betreffenden verdünnten Säure schüttelt. Beim Verdunsten des Lösungsmittels bilden sich ebenfalls Nadeln, die im Wasser und Alkohol sehr leicht löslich sind. Die Analysen gaben folgende Zahlen:

Das salpetersaure Salz wurde mit Kupferoxyd verbrannt.
0,2310 gr gaben 41 cm^3 N bei 22° und 764 mm Druck.

Berechnet für:

Gefunden:		$C_9H_{11}N_2H_3 \cdot H \cdot NO_3$
20,21 %	N	19,71 %

Das schwefelsaure Salz wurde mit $Ba \cdot Cl_2$ versetzt.

0,4706 gr gaben 0,2846 $Ba \cdot SO_4$.

Berechnet für:

Gefunden:		$(C_9H_{11}N_2H_3)_2 \cdot H_2SO_4$
8,12 %	S	8,04 %

Bei der Darstellung des salpetersauren Salzes muß äusserst vorsichtig zu Werke gegangen und in grosser Ver-

dünnung gearbeitet werden, da sich, unter Zerstörung der Hydrazingruppe, leicht Nitroverbindungen des Pseudocumidins zu bilden scheinen.

Am leichtesten bildet sich das essigsaure Salz. Es entsteht, wenn man zur möglichst konzentrierten Lösung des salzsauren Salzes essigsaures Natron setzt. Es scheiden sich dann glänzende, fast farblose Nadeln aus, die sich an der Luft außerordentlich schnell zersetzen. Sie sind ziemlich schwer in Wasser, sehr leicht in verdünntem Alkohol löslich. Von einer Analyse mußte, der leichten Zersetzlichkeit wegen, abgesehen werden. Es unterliegt indessen keinem Zweifel, daß die Verbindung der Formel



entspricht.




II.

Pseudocumylhydrazide.

Läfst man auf ein Hydrazin ein Säurechlorid einwirken, so bilden sich Condensationsprodukte beider Agentien, die man Hydrazide genannt hat. Die Reaktion erfolgt unter Austritt von einem oder zwei Molekülen Salzsäuregas, je nach den Mengenverhältnissen im Sinne folgender Gleichungen:



oder

**Monobenzoylpseudocumylhydrazid.**

Diese Verbindung entsteht, wenn man Benzoylchlorid auf das freie Cumylhydrazin in der Kälte einwirken läßt. Man muß etwa die zehnfache Menge Aether als Lösungsmittel nehmen, weil das Hydrazin sonst nicht vollständig in Lösung geht. Sobald die Lösung klar ist, läßt man unter

stetem Umschütteln die berechnete Menge ($1/2$ Mol.) $C_6H_5 \cdot CO \cdot Cl$ hinzutropfen. Es entsteht sofort ein reichlicher kristallinischer Niederschlag. Derselbe besteht aus dem gebildeten Hydrazid und dem als Nebenprodukt entstandenen salzsauren Hydrazin. Nachdem der Aether abfiltrirt ist, wird die ganze Masse mehrere Male mit Wasser auf dem Dampfbade ausgezogen, wobei die salzsaure Base in Lösung geht. Der Rückstand wird aus heißem Alkohol umkrystallisirt. Man erhält dann die Verbindung in reinem Zustande in dünnen hellgelben Nadeln; sie ist leicht löslich in Alkohol und Chloroform, schwer in Aether, nicht in Wasser. Ihr Schmelzpunkt liegt bei 168° .

Fehling'sche Lösung wird nicht mehr in der Kälte, wohl beim längeren Kochen reduziert, weil dann das Hydrazid vorher verseift wird. Ein im Exsikkator getrocknetes Präparat zeigte folgende Zusammensetzung:

0,3640 gr gaben 36 cm^3 N bei 19° und 754 mm Druck.
 0,3008 gr gaben $0,8320 \text{ CO}_2$ und $0,1949 \text{ H}_2\text{O}$.


Berechnet für		Gefunden:
$C_{16}H_{18}N_2O$		
11,02 %	N	11,26 %
75,59 %	C	75,43 %
7,08 %	H	7,18 %
6,31 %	O	6,31 %
100,00 %		100,18 %

Läßt man auf ein Molekül trockenes Cumylhydrazin reichlich zwei Moleküle Benzoylchlorid einwirken und unterstützt die Reaktion noch durch Erwärmen auf dem Dampfbade, so erhält man, nachdem das nebenbei gebildete salzsaure Salz mit Wasser entfernt ist, eine zähflüssige braune Masse, welche selbst nicht in Kältemischungen erstarrt.

Das Produkt ist in den meisten Lösungsmitteln sehr schwer löslich und scheidet sich beim Verdunsten derselben immer wieder zähflüssig ab. Bei einem Versuch, es zu destilliren, zersetzte es sich unter lebhaftem Aufschäumen. Es unterliegt indessen keinem Zweifel, daß der vorliegende Körper das Dibenzoylpseudocumylhydrazid von der Zusammensetzung



ist. Man erhält nämlich denselben Körper, wenn man auf die Monobenzoylverbindung noch ein Molekül Benzoylchlorid einwirken läßt.




Monoacetylpseudocumylhydrazid.



Diese Verbindung wird ganz analog der entsprechenden Benzoylverbindung dargestellt, nur hat man zu beachten, daß die Heftigkeit der Reaktion möglichst vermindert wird dadurch, daß man die Hydrazinlösung möglichst verdünnt anwendet, sonst bildet sich hauptsächlich die Diacetylverbindung.

Leichter bekommt man die Monoverbindung, wenn statt des Säurechlorides das Anhydrid der Säure auf das trockene Hydrazin einwirkt.



4 gr Essigsäureanhydrid (1 Mol.) läßt man allmählich zu 12 gr (2 Mol.) möglichst trockenem Hydrazin zutropfen;

dabei erhitzt sich die Masse sehr stark. Nachdem die erste heftige Reaktion vorüber, unterstützt man die Wärmeentwicklung auf dem Wasserbade, bis die ganze Masse zu einer braunen Schmelze geworden ist. Beim Erkalten erstarrt sie zu einem krystallinischen Kuchen. Dieses Rohprodukt wird aus viel siedendem Wasser umkrystallisirt.

Man erhält so direkt ein reines Präparat in großen, weißen, naphthalinartigen Blättern von sehr geringem specifischen Gewicht. Die Ausbeute ist nicht sehr groß; das sich als Nebenprodukt bildende essigsäure Hydrazin beschleunigt nämlich die Verharzung der freien Base ungemessen, da es selbst noch weniger beständig ist.

Das Monoacetylpsedocumylhydrazid schmilzt constant bei 157°. Es ist leicht löslich in Alkohol, Benzol, Chloroform, Aether, Petroläther und heißem Wasser, fast unlöslich in kaltem Wasser; es ist aus heißem Wasser fast ohne Verlust umzukrystallisiren. Es reduziert Fehling's Lösung nicht mehr in der Kälte, erst wenn man es längere Zeit damit kocht, weil dann der Acetylrest wieder abgesprengt wird. Ein aus Wasser zwei Mal umkrystallisirtes Produkt zeigte bei der Analyse folgende Zahlen:

0,1554 gr gaben 20 cbm N bei 18° und 757 mm Druck
 I. 0,2202 gr gaben 0,5545 CO₂ und 0,1668 H₂O
 II. 0,1465 gr gaben 0,3696 CO₂ und 0,1112 H₂O.

Berechnet für:

C₁₁H₁₆N₂O

14,59% N

68,75% C

8,33% H

8,33% O

100,00%

Gefunden:

I.

II.

14,80%

68,66% 68,80%

8,40% 8,39%


—

—

Zur Darstellung des Hydrazides mit zwei Acetylresten versuchte ich dieselbe Methode, nur wandte ich über die doppelte Menge Essigsäureanhydrid an. Es resultirte ein ähnliches, zähes Oel, wie die Di-Benzoylverbindung; dasselbe Oel erhält man auch bei der Einwirkung von Acetylchlorid auf das Monoacetylhydrazid neben einer großen Menge harziger Massen. Die Ausbeuten sind indessen so gering, daß von einer weiteren Untersuchung abgesehen werden mußte. —



III.

Aldehydhydrazone.

Das Pseudocumylhydrazin condensirt sich, analog dem Phenylhydrazin, mit fast allen Aldehyden, sowohl der aliphatischen, als auch der aromatischen Reihe, unter Austritt von einem Molekül Wasser und zwar in der Weise, daß sich der Aldehydsauerstoff mit den beiden endständigen Wasserstoffatomen des Hydrazins verbindet.




Diese Condensation verläuft meist sehr energisch und ohne Anwendung eines besonderen Wasser entziehenden Mittels. Am einfachsten läßt man den Aldehyd auf das essigsaure Salz oder das Hydrazin in Essigsäurelösung suspendirt einwirken. Zu dem Zwecke versetzt man die heisse, möglichst gesättigte Lösung des salzsauren Salzes, nachdem man sie schnell filtrirt hat, um die beim Kochen entstandenen harzigen Zersetzungsprodukte wegzunehmen, mit einer Lösung von $1\frac{1}{2}$ Molekülen krystallisirtem, essigsauren Natron. Es entsteht sogleich ein dicker krystallinischer Niederschlag. Derselbe wird durch vorsichtigen Alkohol- und Wasserzusatz wieder gelöst. Sobald völlige Lösung eingetreten ist, setzt man den Aldehyd tropfenweise und unter stetem Umrühren hinzu.

Die Hydrazone werden scheinbar um so beständiger, je größer ihr Molekulargewicht wird. Alle, selbst die weniger beständigen, krystallisiren aus Alkohol fast ausnahmslos in schön ausgebildeten Krystallen. In feuchter Luft zersetzen sich die unbeständigen unter vollständigem Zerfall des Moleküls; es entweichen Stickstoff, Ammoniak und Kohlensäure. Außer anderen harzigen Zersetzungsprodukten, welche nicht weiter untersucht wurden, entsteht beim Zerfall der Kohlenwasserstoff, was später nachgewiesen wird.

Wenn man einem Hydrazon ein Molekül Ammoniak entzieht, wie dies z. B. bei den Phenylhydrazonen¹⁾ leicht möglich ist, so muß man zu den entsprechenden Indolderivaten gelangen.

Folgende Gleichung soll den Prozeß veranschaulichen:



Merkwürdiger Weise ist mir diese weitere Condensation bei keinem einzigen Pseudocumylhydrazon gelungen, obgleich ich bei fast allen folgenden Verbindungen viele zeitraubende Versuche zu diesem Zwecke anstellte. Weder mit frisch geschmolzenem Chlorzink, noch mit konzentrirten Mineralsäuren konnte ich die Ammoniakabspaltung bewirken, trotzdem ich die verschiedensten Mengenverhältnisse und Temperaturunterschiede anwandte.

Es scheint, daß die Zersetzung stets weiter eingreift, da bei allen Condensationsversuchen schäumende, nach dem Erkalten blasige, Massen entstanden, die wahrscheinlich freien Stickstoff und Kohlensäure entliefen.

Aethylidenpseudocumylhydrazon.



Zu der gesättigten Lösung von 17 gr salzsaurem Cumylhydrazin setzt man die Lösung von 18 gr krystallisiertem

¹⁾ Annalen f. Chem. u. Ph. 236. S. 16.

essigsäuren Natron in 160 gr Wasser. Die dabei entstehende krystallinische Fällung wird durch Zusatz von Alkohol auf dem Dampfbade wieder gelöst. Nun läßt man etwas abkühlen und setzt unter beständigem Umrühren 4 gr Acetaldehyd tropfenweise zu. Jeder Tropfen giebt einen dicken Niederschlag von sternförmig angeordneten Nadelchen, die fast farblos sind. Das Condensationsprodukt wird möglichst schnell abgesaugt, weil es sich an der Luft unter Selbsterwärmung zersetzt. Aus Alkohol unkrystallisirt und über Schwefelsäure im Exsikkator getrocknet, erhält man ein hellgelbes, krystallinisches Pulver, das bei 78° zu einem rothen Oele schmilzt. Im vollständig trocknen Zustande läßt es sich im zugeschmolzenen Präparatengläschen aufbewahren; es färbt sich aber am Licht schwach rosa. Es wurde nur eine Stickstoffbestimmung ausgeführt.

0,3465 gr gaben 49 cbm N bei 21° und 760 mm Druck.

Berechnet für:



15,90 %

N

Gefunden:

16,07 %

Propylidenpseudocumylhydrazon.



36 gr salzsaures Pseudocumylhydrazin werden unter geringem Alkoholzusatz in heißem Wasser gelöst. Das Filtrat wird mit 40 gr kryst. essigsäurem Natron versetzt. Nachdem wieder alles Ausgeschiedene durch neuen Alkoholzusatz gelöst ist, fügt man 11 gr frisch bereiteten Propylaldehyd hinzu. Dadurch verwandelt sich die vorher klare, in eine milchig trübe Flüssigkeit, auf der sich nach mehrstündigem Stehen rothbraune Oeltropfen abscheiden. Das Oel wird im Scheidetrichter abgehoben, die übrige Flüssigkeit mit Aether

ausgeschüttelt und die ätherische Lösung zum abgehobenen Oele hinzugefügt.

Nun vertreibt man den Aether, wäscht mit vielem Wasser nach und nimmt wieder mit Aether auf, den man dann im Vacuum abdunstet.

Man erhält so ein dunkles, rothbraunes Oel, welches selbst in Kältemischungen nicht erstarrt. Ein Versuch, dasselbe zu destilliren, scheiterte, da es sich unter stürmischer Gasentwicklung und Verkohlung zersetzt. Ein über Schwefelsäure getrocknetes Produkt zeigte ungefähr die verlangten Zahlen; es scheint, als wenn die Verbindung hartnäckig Spuren vom freien Hydrazin festhält. Es würde das auch die Thatsache erklären, daß Fehling's Lösung von diesem Hydrazon reduziert wird, und daß es sich so stark braun färbt.

- I. 0,1094 gr gaben 15 cbm N bei 16 ° und 762 mm Druck.
 II. 0,1726 gr gaben 23 cbm N bei 15 ° und 765 mm Druck.

Berechnet für:




14,73 % N

Gefunden:

I. II.

15,99 % 15,70 %

Furfuolpseudocumylhydrazon.



Der Aldehyd des Furfurans wirkt in derselben Weise auf das Cumylhydrazin ein, wie die gewöhnlichen Aldehyde, jedoch zeigt sich das Reaktionsprodukt sehr unbeständig. Man läßt ungefähr die halbe Gewichtsmenge (5 gr) Furfuol, mit Alkohol verdünnt, auf das salzsaure Salz der Hydrazinbase (10 gr, gleiche Mol.) in konzentrirter Lösung, zu der man 11 gr Natriumacetat, in 100 gr Wasser gelöst, gesetzt hat, einwirken. Das Gemisch färbt sich tiefviolett und scheidet an der Oberfläche stark gefärbte Oeltropfen ab.

Nach eintägigem Stehenlassen kann man die Reaktion als beendet ansehen. Man extrahirt mit Aether und treibt die ätherische Lösung mit Wasserdämpfen über. Es geht eine ölige Substanz über, welche bei gehöriger Abkühlung zum größten Theile erstarrt; man streicht die Masse auf Thonteller, welche das Oel aufsaugen. Durch vorsichtiges Behandeln mit Alkohol entfernt man den Rest der schmierigen Beimengungen und erhält so eine braune, unbeständige, krystallinische Masse von charakteristischem Geruch nach Heidelbeeren.

Nach mehrfach wiederholten Reinigungen durch Alkohol und nachheriger Fällung mit Wasser erhält man ein zur Analyse taugliches Produkt. Es schmilzt bei $106-108^{\circ}$ unter starker Zersetzung.

0,3182 gr gaben 35 cbm N bei 18° und 764 mm Druck.

Berechnet für:



12,28 %

Gefunden:

N 12,75 %

Benzylidenpseudocumylhydrazon.



Zur konzentrirten Lösung von 37 gr salzsaurem Hydrazin werden 40 gr Natriumacetat in 400 gr Wasser gesetzt. Der sich dabei reichlich bildende Niederschlag wird durch Zusatz von Alkohol wieder gelöst. Alsdann giebt man nicht ganz ein Molekül Benzaldehyd (20 gr) tropfenweise hinzu. Die Reaktion findet plötzlich statt; jeder Tropfen Aldehyd giebt einen schweren, warzenartigen Klumpen von krystallinischem Condensationsprodukt. Es ballt sich fest zusammen und umschließt einen Theil des Aldehydes so, daß er nicht einwirken kann. Man verdünnt deshalb zweckmäßig den Aldehyd mit dem gleichen Volumen Alkohol.

Das krystallinische Produkt wird mit der Saugpumpe abfiltrirt und mit sehr verdünntem Alkohol sorgfältig nachgewaschen. Schliesslich löst man es in wenig heissem Alkohol. Daraus krystallisirt es beim Abkühlen in langen zarten Nadeln, welche sich am Licht schwach rosa färben.

Das Hydrazon schmilzt bei 116° . Es reduziert Fehling's Lösung nicht mehr. Es ist löslich in Alkohol, Aether und Benzol, sehr leicht in heissem Alkohol. Beim Kochen mit Salzsäure wird es in seine Componenten zurückgespalten.

Ein nur wenige Stunden im Exsikkator über Schwefelsäure getrocknetes Präparat zeigte folgenden Stickstoffgehalt:

0,2392 gr gaben 24 cbm N bei 20° und 761 mm Druck.

Berechnet für:

$C_{16}H_{18}N_2$		Gefunden:
11,76 %	N	11,48 %.

Lässt man das Hydrazon im offenen Gefässe mehrere Tage stehen, so zersetzt es sich, unter Aufblähen, vollständig zu einer trüben, milchigen Flüssigkeit und einer zähen harzigen Masse. Die Flüssigkeit wurde vom Harze getrennt, in Aether aufgenommen und mit einem Ueberschuß von Brom in der Kälte behandelt. Sie erwies sich als Pseudocumol, $C_6H_3(CH_3)_3$, da sie beim Bromiren eine in Alkohol schwer lösliche, weisse Bromverbindung lieferte, welche bei $223-224^{\circ}$ schmolz. Dieses Bromprodukt konnte identifizirt werden mit dem Tribrompseudocumol, $C(CH_3)_3Br_3$, vom Schmelzpunkte 226° ; denn eine Brombestimmung gab die für dasselbe geforderten Zahlen:

0,1620 gr gaben bei der Br.-Best. nach Carius 0,2564 AgBr.

Berechnet für:

$C_9H_9Br_3$		Gefunden:
67,22 %	Br.	67,34 %.

Acetylbenzylidenpseudocumylhydrazon.

Behandelt man das Hydrazon mit Essigsäureanhydrid auf dem Wasserbade, so bildet sich genannte Acetylverbindung von folgender Zusammensetzung:



Der leichten Oxydirbarkeit des Hydrazons wegen wird allerdings der größte Theil verharzt und die Ausbeute beeinträchtigt. Nach halbstündiger Einwirkung setzt man Wasser zu und kocht kurze Zeit. Dabei wird das überschüssige Anhydrid in die Säure verwandelt, in deren Lösung auch das Acetylderivat geht. Man filtrirt vom Harze ab und läßt das Filtrat abdunsten. Es fällt eine ziegelrothe, amorphe Masse aus, welche in Alkohol und Chloroform leicht löslich ist und sich aus derselben immer wieder amorph ausscheidet. Die Verbindung schmilzt bei 91° und zeigte bei der Verbrennung folgende Werthe:

0,3012 gr gaben 27 cbm N bei 23° und 768 mm Druck.

Berechnet für:




10,00 %

N

Gefunden:

10,21 %.

Anisaldehydpseudocumylhydrazon.



Die Reaktion verläuft derjenigen mit Benzaldehyd ganz analog; die Ausbeute ist beinahe quantitativ. Das Hydrazon zeichnet sich von den vorhergehenden durch seine größere Beständigkeit aus. Es ist leicht löslich in Bromäthyl,

Schwefelkohlenstoff, Chloroform, Benzol, Essigäther, Aether und heissem Alkohol, schwer in kaltem Alkohol, nicht löslich in Wasser, Ligroin und Eisessig. Da das Hydrazon in kaltem Alkohol so schwer löslich ist, ist es zweckmässig, die Agentien in einer Lösung von 80% Alkohol auf einander einwirken zu lassen.

Bei einer Ausbeute von über 5 gr Hydrazon, welches schon einmal aus heissem Alkohol umkrystallisirt war, waren folgende Mengen verwendet:

5 gr salzsaures Pseudocumylhydrazin, 5 gr krystallisirtes Natriumacetat und 3 gr Anisaldehyd. Das Rohprodukt ist gelb; umkrystallisirt, bildet es lange, weisse, seidenartige Nadeln vom Schmelzpunkt $129\frac{1}{2}$ — 130° .

Bei 160° zersetzt es sich unter stürmischer Gasentwicklung.

Analysen:

0,2236 gr gaben 0,6237 CO_2 und 0,1512 H_2O
und
0,3120 gr gaben 29 cbm N bei 20° und 768 mm Druck.

Berechnet für:

$\text{C}_{17}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{O}$		Gefunden:
76,12%	C	76,07%
7,46%	H	7,51%
10,45%	N	10,73%
5,97%	O	5,97%
100,00%		100,28%

Cinnamylpseudocumylhydrazon.



Diese Verbindung zeichnet sich durch ihre aufserordentliche Beständigkeit und grosse Ausbeute bei ihrer Darstellung

aus. Zu einer Ausbeute von über 11 gr Hydrazon hatten nur 6 gr Zimmtaldehyd auf 9 gr salzsaures Cumylhydrazin und 9 gr Natriumacetat eingewirkt. Es bildete sich sofort ein dicker krystallinischer Bodensatz. Derselbe wurde abgesaugt und aus viel-heissem Alkohol umkrystallisirt.

Man erhält das Hydrazon so theils blättrig, theils nadel-förmig von schön gelber Farbe. Es ist in Benzol, Alkohol, Ligroïn, Eisessig schwer löslich, leicht in heissem Alkohol, Aether, Schwefelkohlenstoff, Chloroform, Bromäthyl und Eis-essigäther. Es schmilzt bei 156–157° unter langsamer Blasenentwicklung. Es läßt sich in Folge dessen auch nicht destilliren, selbst nicht im Vacuum, da es sich unter Entwicklung dicker gelber Dämpfe zum allergrößten Theil zersetzt. Es müßte dabei ein Pyrazolderivat, nämlich das 1,5 Pseudocumylphenylpyrazolin, entstehen; die Ausbeute ist indessen so gering, daß von einer ferneren Untersuchung abgesehen wurde.


0,3118 gr gaben 29½ cbm N bei 22° und 768 mm Druck,
0,1972 gr gaben 0,5907 CO₂ und 0,1359 H₂O.

Berechnet für:

C ₁₈ H ₂₀ N ₂		Gefunden:
10,61 %	N	10,83 %
81,82 %	C	81,69 %
7,57 %	H	7,62 %
100,00 %		100,14 %




IV.

Ketohydrazone.


Die Condensation des Pseudocumylhydrazins mit Ketonen verläuft ganz analog derjenigen der Aldehyde. Je nach der Anzahl der Carbonylgruppen der angewandten Ketone treten ein oder zwei Moleküle Hydrazin in Reaktion. Die Ketohydrazone sind durchweg beständiger, als die entsprechenden Aldehydverbindungen, und zwar scheint auch bei ihnen die Beständigkeit mit dem Molekulargewicht zuzunehmen; dementsprechend sind sie alle leicht im krystallisirten Zustande zu erhalten.

Genau, wie die Aldehydverbindungen des Phenylhydrazins, lassen sich auch die Ketophenylhydrazone durch Ammoniakabspaltung in Indolderivate überführen, entsprechend der Gleichung:



Bei den entsprechenden Cumylverbindungen ist das indessen nicht möglich, wie eine große Anzahl von Versuchen bewiesen haben. Während Mineralsäuren überhaupt nicht einwirken, wird bei der Chlorzinkschmelze, unter vollständigem Zerfall des Moleküls, das Amin zurückgebildet, wie wir bei dem Acetonhydrazon sehen werden. —

Acetonpseudocumylhydrazon.



Zu der gesättigten Lösung von 20 gr Pseudocumylhydrazin setzt man 22 gr Natriumacetat (kryst.) in 200 gr Wasser und so viel Alkohol, bis die Lösung wieder klar wird. Alsdann tröpfelt man unter beständigem Umrühren 6½ gr käufliches Aceton hinzu. Das Hydrazon fällt als weisse krystallinische Masse aus, welche man schnell absaugt und mit viel Wasser und schliesslich mit etwas Aetheralkohol auswäscht. Das auf Thon über Schwefelsäure getrocknete Präparat ist leicht löslich in Alkohol, Aether und Ligoïn. Aus letzterem krystallisirt ein Theil in langen, um ein Centrum geordneten Nadeln, während die Hauptmasse in Lösung bleibt und schnell verharzt. Es schmilzt bei 87° unter vollständiger Zersetzung. Auch das krystallisirte Präparat muſs in zugeschmolzenen Glasröhren verwahrt werden.

Ueberläſst man das Hydrazon an feuchter Luft sich selbst, so wird aller Stickstoff abgespalten, und es bildet sich, analog wie bei Benzylidenpseudocumylhydrazon, der Kohlenwasserstoff zurück, den man leicht als Tribrompseudocumol nachweisen kann.


Wie schon erwähnt, miſslangen alle Versuche, aus dem Hydrazon das entsprechende Indolderivat darzustellen.

Schmilzt man das Hydrazon mit der fünffachen Menge frisch entwässerten Chlorzinks zusammen bei 180–200°, so wird das NH₃ wahrscheinlich abgespalten. Bei der hohen Temperatur scheint aber der Pyrrolring nicht beständig zu sein und wird wieder gesprengt; bei unter 180° wirkt Chlorzink garnicht ein.

Wenn man die in Wasser aufgenommene braune Schmelze mit Wasserdämpfen übertreibt, so bekommt man ein hellbraunes Oel, welches beim Erkalten vollständig erstarrt. Es

ist leicht in Alkohol, sehr wenig in Wasser löslich und krystallisirt aus demselben in durchsichtigen Nadeln. Sie schmelzen bei 62° und lassen sich unzersetzt bei $234-236^{\circ}$ destilliren.

Die Analysen gaben die richtigen Zahlen für Pseudo-cumidin von der Stellung



- I. 0,1296 gr gaben 11,5 cbm N bei 20° und 764.
 II. 0,1716 " " 15,5 " " " 20° " 764.
 III. 0,1912 " " " 0,5624 CO_2 und 0,1638 H_2O .
 IV. 0,1120 " " " 0,3278 " " 0,0988 "

Berechnet für: Gefunden:


$C_9H_{13}N$.	I.	II.	III.	IV.
			I.	II.
N 10,37 %	10,20	10,38	10,20	10,38 %
C 80,00 %			80,23	79,82 %
H 9,63 %			9,52	9,73 %
100,00 %			99,95	99,93 %

Die Analysen No. I und III sind von dem direkt mit Wasserdämpfen übergetriebenen Präparat gemacht.

Dieses Produkt zeigte anfangs die Indolreaktion mit dem mit Salzsäure angefeuchteten Fichtenspahn. Dementsprechend ¹⁾ ist auch der Kohlenstoff zu hoch. Stickstoff und Wasserstoff in den Prozentzahlen etwas zu niedrig gefunden. Die Analysen II und IV sind von einem Produkte gemacht, welches außer der Destillation nochmals umkrystallisirt war, in Folge dessen die Zahlen auch genauer stimmen.

Bei analytischen Bestimmungen des Hydrazons selbst, konnten keine genauen Zahlen erzielt werden, da sich dasselbe, trotz der größtmöglichsten Beschleunigung, meistens schon während der Wägung zu zersetzen begann.

¹⁾ $C_6H_2(CH_3)_3 < \begin{smallmatrix} NH \\ CH \end{smallmatrix} > C_6H_5$ enthält
 8,09 % N, 83,23 % C und 8,67 % H.

Acetophenonpseudocumylhydrazon.

Zur Reaktion wurden verwandt 8 gr salzsaures Cumylhydrazin, 9 gr kryst. Natriumacetat und 5 gr Acetophenon. Das Condensationsprodukt sondert sich langsam als braunes Oel ab. Nach ein- bis zweitägigem Stehen kann die Reaktion als vollendet betrachtet werden. Das Oel ist dann zu einem krystallinischen Kuchen erstarrt. Die Masse wird zerrieben und mehrere Male mit Wasser, schliesslich mit verdünntem Alkohol gereinigt. Das Hydrazon ist leicht löslich in Schwefelkohlenstoff, Petroläther, Benzol und heissem Alkohol. Aus Chloroform krystallisirt es in glänzenden, schwach gefärbten Nadeln. Im Schmelzröhrchen beginnt es bei 137° zu sintern und schmilzt einheitlich bei 144°.

0,3268 gr gaben 30,6 cbm N bei 16° und 765 mm Druck.


Berechnet für:



11,11% N

Gefunden:

10,98%

Benzophenonpseudocumylhydrazon.

Zur gesättigten Lösung eines Moleküls des essigsauren Hydrazins fügt man die berechnete Menge Benzophenon, in Alkohol gelöst. Die Einwirkung erfolgt nicht sofort vollständig; erst nach ca. 24 Stunden hat sich das Condensationsprodukt abgeschieden. Es ist in den meisten Lösungsmitteln, als Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Petroläther, Benzol, löslich, verhältnissmässig am leichtesten in

heißem Alkohol, aus welchem es zur Analyse umkrystallisirt wurde. Es bildet dicke, gelbe Prismen, die im reinen Zustande sehr haltbar sind; enthalten die Krystalle aber Spuren von Mutterlauge, so zerflossen sie nach mehreren Tagen zu einem hellbraunen Oel.


Beim anhaltenden Kochen mit Fehling's Lösung wird dieselbe reduziert. Das Hydrazon schmilzt bei 121°.

0,2860 gr gaben 24 cbm N bei 18° und 752 mm Druck,
0,1780 gr gaben 0,5495 CO₂ und 0,1134 H₂O.

Berechnet für:

C ₂₂ H ₂₂ N ₂		Gefunden:
8,92 %	N	9,30 %
84,08 %	C	84,20 %
7,00 %	H	7,07 %
100,00 %		100,57 %

Benzylidenacetonepseudocumylhydrazon.



Man läßt unter denselben Verhältnissen, wie bei der Condensation mit Aceton, 6 gr salzsaures Hydrazin, 6 gr Natriumacetat und 4^{1,2} gr reines Benzylidenaceton, welches zuvor aus Chloroform umkrystallisirt wurde, auf einander einwirken.

Die Reaktion findet sogleich vollständig statt. Das Hydrazon setzt sich in Form gelber, warzenartiger Ballen am Rührstabe fest. Es ist leicht löslich in Aether, Chloroform, Benzol, Aceton, schwerer in Petroläther und Alkohol, aus dessen gesättigter Lösung es in gut ausgebildeten, gelben Nadeln krystallisirt, die noch deutlich den

Cumaringeruch des Benzoiacetons bewahren. Ein Präparat vom Schmelzpunkt 164° zeigt folgende Zusammensetzung:

0,1640 gr gaben 14,75 cbm N bei 15° und 746 mm Druck.

Berechnet für:




10,07 %

N

Gefunden:

10,30 %

Benzoïnspseudocumylhydrazon.



Man vollzieht die Condensation in verdünntem Alkohol. Beim Zusatz des Benzoïns färbt sich die anfangs gelbe Lösung tiefroth und scheidet nach mehrtägigem Stehen schwach gefärbte Krystalle ab. Dieselben sind schwer löslich in Aether und kaltem Alkohol. Aus heissem Alkohol krystallisiren sie in farblosen Nadeln vom Schmelzpunkt $176-177^{\circ}$. Fehling's Lösung wird nicht mehr reduzirt, auch nicht beim anhaltenden Kochen.

0,3014 gr gaben 22 cbm N bei 15° und 754 mm Druck.

Berechnet für:





8,13 %

N

Gefunden:

8,46 %

Benzilpseudocumylosazon.



Diese Verbindung ist der vorigen ganz analog darzustellen, nur muß ein großer Ueberschuß von Hydrazin an-

gewandt werden. Das Condensationsprodukt ist jedoch kaum vom anhaftenden, unzersetzten Benzil zu befreien, da beide Körper fast dieselben Lösungsverhältnisse haben; ebenso wenig gelingt die Trennung durch Destillation, da vollständige Verkohlung eintritt. Durch sehr häufiges Umkrystallisiren aus heißem Alkohol habe ich ein Produkt erhalten, dessen Schmelzpunkt zwischen 280° und 300° lag. Eine Stickstoffbestimmung zeigte dementsprechend auch zu wenig Stickstoff.

0,1718 gr gaben 17 cbm N bei 21° und 762 mm Druck.

Berechnet für:




11,81%

N

Gefunden:

11,28%

Alloxanpseudocumylhydrazon.



Genau, wie ein Diketon, verbindet sich das Alloxan mit je zwei Molekülen des Hydrazins. Man kann die Condensation in wässriger Lösung des salzsauren Salzes, der man $1\frac{1}{2}$ Mol. Natriumacetat zugesetzt hat, bewirken. Die Verbindung sinkt beim Zusatz der wässrigen Alloxanlösung als schwere braune Oeltropfen zu Boden, die nach kurzer Zeit erstarren. Man wäscht die Masse wiederholt mit Wasser und Aetheralkohol aus und erhält so eine chokoladenbraune, krystallinische Masse blättriger Struktur. Die Substanz ist in fast allen Lösungsmitteln, Wasser, Aether, Benzol, Toluol, Anilin, Chloroform, Schwefelkohlenstoff und Petroläther so gut wie unlöslich.

Das Präparat enthält im lufttrockenen Zustande noch Wasser, welches erst bei höherer Temperatur entweicht.

Zur Analyse mußte es längere Zeit bei 160° getrocknet werden, ehe es die richtigen Zahlen zeigte.

0,1336 gr gaben 24 cbm N bei 20° und 758 mm Druck.

Berechnet für:

$C_{22}H_{22}N_6O_2$ Gefunden:

20,69% N 20,59%.

V.

Einwirkung von Ketonensäuren auf Pseudocumylhydrazin.

Ketonensäuren und Aldehydsäuren verhalten sich zu Hydrazinen gerade so, wie die Ketone und Aldehyde selbst. Genauer untersucht wurde nur die Einwirkung von Pyrotraubensäure auf Pseudocumylhydrazin; der Carbonylsauerstoff tritt mit den beiden Amidwasserstoffen des Hydrazins aus, und es entsteht neben Wasser die

Pseudocumylhydrazonbrenztraubensäure.



Am vortheilhaftesten erhält man diese Hydrazonsäure nach der allgemeinen Darstellungsweise aller Hydrazone. Auf das essigsaure Salz (10¹/₂ gr salzsaures Hydrazin und 12 gr kryst. Natriumacetat) läßt man 5 gr Brenztraubensäure einwirken. Es bildet sich sofort ein grünlichgelber Niederschlag. Derselbe wird abgesaugt und mit verdünntem Alkohol ausgewaschen. Die Ausbeute ist nahezu quantitativ: von 5 gr Traubensäure erhält man über 10 gr Hydrazon. Das Produkt ist unlöslich in Wasser, schwer löslich in kaltem Alkohol, leicht in heißem Alkohol, Ligroïn, Schwefelkohlenstoff und Chloroform; es scheidet sich beim Verdunsten als reingelbes amorphes Pulver aus; nur aus Chloroform

krystallisirt es in zarten verfilzten Nadeln. Es ist sehr beständig, läßt sich in offenen Schaaln bei über 100° leicht trocknen. Bei 150° schmilzt es zu einem schäumenden Oele, wobei reichlich Ammoniak und Kohlensäure entweicht. Es bildet sich deshalb auch nicht die entsprechende Indolcarbonsäure beim Erhitzen mit Salzsäure oder Schmelzen mit Chlorzink. Fehling's Lösung wird von der Schmelze schon in der Kälte reduziert.

Das aus Chloroform krystallisirte Produkt wurde zu den Analysen verwandt.

0,1712 gr gaben 19 cbm N bei 16° und 770 mm Druck.

0,1106 gr gaben 0,2647 CO_2 und 0,0729 H_2O .

Berechnet für:



12,73 %

65,45 %

7,27 %

14,55 %

100,00 %

N

C

H

O

Gefunden:

13,08 %


65,28 %

7,32 %

14,55 %

100,23 %

Pseudocumylhydrazonbrenztraubensäure-Aethylester.



8 gr Hydrazon wurden in ein Gemisch von 10 gr konzentrirter Schwefelsäure und 90 gr absolutem Alkohol eingetragen und am Rückflusskühler erhitzt. Nach einiger Zeit geht das Hydrazon vollständig in Lösung, und die Esterifizierung ist nach 5—6 Stunden vollendet. Man versetzt dann mit viel Wasser, wodurch der Ester ausgefällt wird. Man filtrirt ihn auf dem Faltenfilter unter häufigem Nachwaschen mit Wasser. Er ist, außer in Wasser, in den meisten Lösungsmitteln äußerst leicht löslich, weshalb er schlecht

in krystallisirtem Zustande zu erhalten ist. Zur bessern Reinigung eines Präparates, welches zur Analyse verwandt werden sollte, wurde der Ester mehrere Male abwechselnd in Alkohol gelöst und mit Wasser wieder ausgefällt, bis der Schmelzpunkt konstant bei 144° stehen blieb. Das Präparat unterscheidet sich von der freien Säure durch seine gröfsere Beständigkeit bei höherer Temperatur. Man kann längere Zeit auf ca. 180° erhitzen, ohne dafs Zersetzung eintritt, während die freie Säure schon beim Schmelzen zerfiel.

0,4132 gr gaben $40\frac{1}{2}$ cbm N bei 18° und 764 mm Druck.

Berechnet für:



11,29 %

N

Gefunden:

11,37 %

Methylester.



5 gr Brenztraubensäurehydrazon werden in 50 gr absolutem Methylalkohol gebracht, dem man zuvor 5 gr konzentrirte Schwefelsäure zugesetzt hat, und am Rückflusskühler 5–6 Stunden im Sieden erhalten. Im Uebrigen verfährt man ganz analog, wie beim Aethylester. Der Methylester ist fast ebenso leicht löslich. Im Chloroform ist er weniger löslich und krystallisirt aus letzterem in zarten Blättchen vom Schmelzpunkt 187 – 188° .

0,2142 gr gaben 22,5 cbm N bei 17° und 768 mm Druck.

Berechnet für:




11,97 %

N

Gefunden:

12,27 %

Hydrazonbrenztraubensaures Natrium.



Beim Verseifen der Ester, am besten des Methylesters, mit alkoholischer Natronlauge in der Hitze erhält man das Natriumsalz der Hydrazonsäure. Es ist leicht löslich in Wasser und Alkohol. Aus letzterem krystallisirt es in Blättern und aus ersterem in Nadeln und enthält 4 Moleküle Krystallwasser, welche es beim Erwärmen bis auf 120° vollständig verliert. Es zeichnet sich durch grofse Beständigkeit bei höheren Temperaturen aus; man kann es bis nahezu auf 300° erhitzen, ohne dafs Zersetzung eintritt. Das Kalium- und Bariumsalz verhalten sich ganz ähnlich.

0,1059 gr verloren 0,0244 Wasser bei 4stündigem Erhitzen auf 120° .

0,0815 gr trockenes Salz gaben beim Abrauchen mit konzentrirter Schwefelsäure 0,0244 Na_2SO_4 .

Berechnet für:



22,93% H_2O



9,50%

Gefunden:

23,04%

Na

9,69%.




VI.

Pyrazolinderivate des ψ -Cumylhydrazins.

Diese Verbindungen bilden sich bei der Einwirkung ungesättigter Aldehyde und Ketone in der Wärme auf die freie Hydrazinbase. Es bildet sich wahrscheinlich zunächst das entsprechende Hydrazon, welches durch Molekularumlagerung, durch Wanderung des Imidwasserstoffes und unter Lösung der doppelten Bindung in das Pyrazolin übergeht.

Genauer untersucht wurden die Verbindungen mit Akrolein und Mesityloxyd. —

Pseudocumylpyrazolin.

Der Körper entsteht durch Umlagerung aus dem Akroleinhydrazon:



welches bei der Destillation in das Pyrazolin übergeht. Zur Darstellung muß ganz frisch bereitetes Akrolein verwandt werden, da sich das polymere Disacryl, in welches Akrolein bekanntlich allmählich übergeht, nicht mehr condensirt. Aus demselben Grunde kann die Condensation nicht in wässriger oder verdünnter, alkoholischer Lösung vollzogen werden; denn das Akrolein würde sich leichter polymerisiren, als in Reaktion mit der Hydrazinbase treten. Man muß

deshalb das Akrolein direkt auf das Hydrazin einwirken lassen. Da die Reaktion zu Anfang äußerst heftig verläuft, ist es geboten, beide Agentien mit absolutem Aether zu verdünnen.

80 gr frisch ausgefälltes, möglichst trocknes Pseudocumylhydrazin werden in 500 gr absolutem Aether gelöst; dazu fügt man in kleinen Portionen 30 gr Akrolein, mit 60 gr absolutem Aether verdünnt. Es tritt jedes Mal deutliche Reaktion ein, welche aber bald nachläßt. Nachdem alles Akrolein zugefügt ist, vollendet man den Prozeß durch lebhaftes Kochen auf dem Dampfbad. Nach 12–15stündigem Erhitzen ist der beißende Geruch des Akroleins verschwunden und die Einwirkung zu Ende. Dann wird der größte Theil des Aethers abgetrieben und das Reaktionsgenisch mit 600 Gewichtstheilen 2% Schwefelsäure versetzt. Alles unveränderte Hydrazin wird dadurch in das schwefelsaure Salz verwandelt und bleibt deshalb bei der nun folgenden Destillation im Dampfstrom im Kolben zurück. Es geht mit den Wasserdämpfen ein leichtes, hellgelbes Oel über. Dasselbe wird mit Aether ausgezogen und nach der Entfernung des letzteren im Vacuum fraktionirt destillirt, da es sich sonst unter starker Ammoniakentwicklung sehr schnell zersetzt. Bei einem Druck von 20 mm Quecksilbersäule beginnt die Destillation schon unter 100°; indessen muß die Temperatur bis auf 170° gesteigert werden, ehe eine nennenswerthe Menge übergeht. Von da ab bis zu 240° ist die Fraktion ziemlich reichlich. Diese Fraktion wurde durch nochmalige Destillation im Vacuum zu zerlegen gesucht; das Thermometer blieb aber innerhalb der genannten Grenzen nirgends stationär, so daß sich eine Reinigung des Oeles auf diese Weise als unmöglich herausstellte. Das zähe, nicht unangenehm riechende Oel wurde mittelst Kochsalz und Schnee stark abgekühlt und mit einem Glasstabe gerieben. Es erstarrt dann vollständig zu einem steifen, krystallinischen Brei. (8 gr Oel mußten über eine Stunde ununterbrochen mit dem Glasstabe gerieben werden, ehe genannte Erstarrung eintrat.) Dieser Krystallbrei wird sorg-

fältig auf dem Thonteller ausgebreitet, welcher nach ein-
tägigem Stehenlassen alle noch öligen Bestandtheile aufge-
nommen hat. Das so erhaltene Rohprodukt wird ein Mal
aus wenig heißem Alkohol umkrystallisirt. Man erhält so
das Pyrazolin in reingelben, kompakten Prismen, welche bei
 $81\frac{1}{2}$ — 82° schmelzen. Sie sind unlöslich in Wasser und
Ligroïn, wenig in kaltem, leicht in heißem Alkohol, in Aether,
Schwefelkohlenstoff, Chloroform und Benzol. Das aus Al-
kohol umkrystallisirte Pyrazolin zeigte folgende prozentische
Zusammensetzung:

- 0,1190 gr gaben 15 cbm N bei 10° und 758 mm Druck.
I. 0,1786 gr gaben 0,5004 CO_2 und 0,1370 H_2O .
II. 0,2016 gr gaben 0,5662 CO_2 und 0,1559 H_2O .

Berechnet für:		Gefunden:		
$\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{N}_2$		I.	II.	N
76,59 %	C	76,38 %	76,58 %	
8,51 %	H	8,51 %	8,58 %	
14,90 %	N	15,04 %		15,04 %
100,00 %		99,93 %	100,20 %	

Das Pyrazolin ist sehr widerstandsfähig gegen oxydirende
Mittel. Fehling's Lösung wird nicht mehr reduziert, selbst
nicht bei anhaltendem Kochen. Es zeigt beim Behandeln
mit Chlorzink oder Mineralsäuren unter den verschiedensten
Umständen natürlich keine Spur von Indolbildung.

Behandelt man die alkoholische Lösung mit geringen
Mengen Brom, in Aether gelöst, so färbt sich die Lösung
schön blattgrün, bei stärkerem Bromzusatz wird die Färbung
so intensiv, daß die Lösung schon in dünnen Schichten un-
durchsichtig wird. Beim Verdunsten der Lösungsmittel
scheiden sich zarte Blättchen aus, welche Brom enthalten.
Es scheinen sich verschiedene Bromsubstitutionsprodukte
gebildet zu haben, welche zu trennen nicht gelungen ist,
da kein konstanter Schmelzpunkt erzielt werden konnte.


Das Pyrazolin hat schwach basischen Charakter. Kocht man seine alkoholische Lösung mit wenig konzentrierter Salzsäure, so scheiden sich beim Abdunsten harte, grüne Krystalle eines salzsauren Salzes¹⁾ ab. Der Chlorwasserstoff ist aber äußerst locker gebunden, das Hydrochlorat zerfällt schon wieder beim Auflösen in Wasser.

Ein lufttrockenes Präparat gab bei verschiedenen Analysen folgende Zahlen:


- I. 0,2076 gr gaben bei direkter Zersetzung mit Wasser und Silbernitrat 0,1334 Ag-Cl.
 II. 0,1930 gr gaben bei der Verbrennung mit CaO 0,1257 Ag-Cl.
 III. 0,2336 gr gaben 25 cbm N bei 16° und 766 mm Druck.
 IV. 0,2005 gr gaben 0,4708 CO₂ und 0,1378 H₂O.

Berechnet für:		Gefunden:	
C ₁₂ H ₁₆ N ₂ ·H-Cl.		I.	II.
Cl	15,81°/o	15,89°/o	16,12°/o
N	12,48°/o	III. 12,58°/o	12,58°/o
C	64,14°/o	IV. 64,04°/o	64,04°/o
H	7,57°/o	IV. 7,63°/o	7,63°/o
100,00°/o		100,14°/o	100,47°/o

Trimethylpseudocumylpyrazolin.



Es entsteht auch durch Umlagerung aus dem entsprechenden Hydrazon:



¹⁾ Vergl. Balbiano, *Gazetta chimica italiana*, 18, 371. B. fand, dafs das p. Tolypyrazolin in konz. Salzsäure löslich und durch Wasser wieder ausfällbar ist, hat aber nicht weiter untersucht, ob sich ein Salz gebildet hatte.

Die Condensation wird ganz analog derjenigen mit Akrolein in ätherischer Lösung bewirkt. Man braucht nicht so lange zu erhitzen, da der charakteristische Geruch des Mesityloxydes nach Pfefferminze bald verschwindet. Man versetzt dann auch mit überschüssiger Schwefelsäure und destillirt im Dampfstrom. Man erhält dann ein zähes, braunes Oel, welches selbst nicht in Kältemischungen erstarrt. Beim Druck der Atmosphäre läßt es sich nicht destilliren, wohl aber beim Druck einer Quecksilbersäule von 20 mm, obwohl es selbst hierbei reichlich Ammoniak entwickelt. Von den Fraktionen erstarrt diejenige zwischen 160—200°. Auch hier läßt sich der Siedepunkt nicht genauer normiren, da bei einer Wiederholung der Destillation das Interwall eher vergrößert wurde, die Zersetzung also weiter um sich griff.

Der krystallinische Brei wird sorgfältig durch Abpressen von noch anhaftendem Oele befreit und mehrere Male aus Alkohol umkrystallisirt. Das Pyrazolin krystallisirt in langen schmalen Blättern, welche constant bei 63° schmelzen. Es ist leicht löslich in Aether, Chloroform und Benzol. Auch in verdünnten Säuren löst es sich beim Kochen auf und bildet mit ihnen sehr leicht zersetzliche Salze. Fehling's Lösung wird nicht mehr reduziert, ebensowenig als sich bei der Behandlung mit Chlorzink oder condensirten Mineralsäuren eine Spur eines Indolderivates bildet.

Analysen:

0,1372 gr gaben 15 cbm N bei 18° und 752 mm Druck.

0,1226 gr gaben 0,3514 CO₂ und 0,1062 H₂O.

Berechnet für:


C ₁₅ H ₂₂ N ₂		Gefunden:
12,17%	N	12,48%
78,26%	C	78,22%
9,57%	H	9,63%
100,00%		100,33%



VII.

Einwirkung von Thionylanilin auf Pseudocumylhydrazin.

Thionylanilin setzt sich mit der Hydrazinbase unter Austritt eines Moleküls Anilin, zu einem hydrazonähnlichen Produkt um.



Diese Verbindung entsteht, analog allen Hydrazonen, aus dem essigsauren Salze. Besser gelingt die Darstellung, wenn man gleiche Moleküle Thionylanilin und Cumylhydrazin in ätherischer Lösung direkt auf einander einwirken läßt; man kocht längere Zeit am Rückflusskühler. Beim Verdunsten des Aethers scheidet sich das schwer lösliche Thionylpseudocumylhydrazon aus. In Chloroform und Alkohol ist es leichter löslich, scheidet sich aber aus allen Lösungen als amorphes, gelbes Pulver aus. Im Schmelzröhrchen beginnt es bei 80° zusammenzusintern und schmilzt bei 104°.

0,1032 gr gaben bei der Oxydation mit Bromwasser und
Ba-Cl₂ 0,1223 BaSO₄.

0,1956 gr gaben 24,5 cbm N bei 170° und 762 mm Druck.

Berechnet für:

$\text{C}_9\text{H}_{12}\text{N}_2\text{SO}$

16,32% S

14,28% N


Gefunden:

16,27%


14,52%.



VIII.

Harnstoffabkömmlinge des Pseudocumylhydrazins.**Phenylpseudocumylsemicarbazid.**

Läßt man ein Molekül Phenylcyanat auf ein Molekül Pseudocumylhydrazin einwirken, so findet direkte Addition statt, und es entsteht eine dem Harnstoff analog constituirte Verbindung.




6 gr frisch gefälltes trocknes Hydrazin werden in einen trocknen Rundkolben gebracht. Man setzt einen Rückflußkühler auf und gießt durch denselben 4 gr mit der fünf-fachen Menge Alkohol verdünntes Phenylcyanat. Es findet anfangs unter starker Wärmeentwicklung Reaktion statt, und man trägt Sorge, daß dieselbe durch gelinde Wärmezufuhr zu Ende geführt wird. Dann treibt man den Alkohol ab und erhitzt über offenem Feuer so stark, bis die Masse eben zu schäumen anfängt. Von da ab zersetzt sich das in geringem Ueberschuß angewandte Hydrazin. Nach dieser Zeit erst, wie mehrfache Versuche bewiesen, ist der Prozeß als wirklich beendet zu betrachten. Es bildet sich beim

Abkühlen eine steinharte, krystallinische Schmelze. Man zieht dieselbe mit siedendem Alkohol aus und erhält aus diesem sofort ein fast rein weißes Rohprodukt von Semicarbazid. Nochmals aus Alkohol umkrystallisirt, scheidet es sich als fein krystallinisches Pulver aus. Es schmilzt bei 207° , nachdem es sich bei 204° zu einem Klumpen zusammengeballt hat und zersetzt sich bei höherer Temperatur. Es ist wenig löslich in kaltem Alkohol, Aether, Chloroform und Benzol, sehr leicht in heißem Alkohol.

0,1292 gr gaben 17,5 cbm N bei 19° und 768 mm Druck.
0,1370 gr gaben 0,3583 CO_2 und 0,0875 H_2O .

Berechnet für:



15,61%

N

7,06%

H

71,38%

C

5,95%

O

100,00%

Gefunden:

15,73%

7,10%

71,31%



5,95%

100,09%

Pseudocumylthiosemicarbazid.



Es werden gleiche Moleküle salzsaures Cumylhydrazin und Rhodanammonium in der zweieinhalbfachen Menge absolutem Alkohol gelöst und 12–15 Stunden am Rückfluschkühler lebhaft gekocht. Dann überläßt man das Gemisch einen Tag sich selbst; die Umsetzung vollzieht sich während dieser Zeit vollständig:



Die Masse ist während dieser Zeit vollständig zu einem dicken Krystallbrei erstarrt. Man saugt das Reaktionsgemisch mit der Pumpe ab und wäscht wiederholt mit kaltem Wasser nach, wodurch der gleichzeitig gebildete Salmiak entfernt wird. Den Rückstand krystallisirt man aus sehr viel heißem Alkohol um und erhält so das Semicarbazid in kleinen, schwach gefärbten, verfilzten Nadeln. War die Lösung zu konzentriert, so fällt es stets als voluminöses, amorphes Pulver aus.

Zur Analyse wurde es noch einmal aus heißem Alkohol umkrystallisirt. Es zeigt dann den Schmelzpunkt 219° , bei welcher Temperatur es sich plötzlich zersetzt.

0,1824 gr gaben 0,2031 BaSO_4 durch Oxydation mit Bromwasser und BaCl_2 .
 0,2334 gr gaben 42 cbm N bei 23° und 762 mm Druck.

Berechnet für:



20,09 %

15,31 %

N

S

Gefunden:


20,33 %

15,35 %

Eine Kohlenwasserstoffbestimmung zeigte auch die richtigen Werthe; die Zahlen sind jedoch verloren gegangen.


Das Semicarbazid ist sehr schwer löslich in Aether, Chloroform, Benzol, Schwefelkohlenstoff und kaltem Alkohol, sehr leicht in heißem. Es löst sich in Wasser spurenweise; mit Salzsäure unter Druck behandelt, spaltet es ein Molekül Ammoniak ab und geht über in das

Pseudocumylthiocarbazin.



5 gr Pseudocumylthiosemicarbazid wurden mit der fünffachen Menge zwanzigprozentiger Salzsäure im Rohr ungefähr

24 Stunden auf 130–140° erhitzt. Bei dieser Temperatur vollzieht sich die Ammoniakabspaltung, und es bildet sich neben Salmiak das salzsaure Carbizin.



Man nimmt den Inhalt des Rohres mit viel Wasser auf, übersättigt mit Natronlauge und extrahirt mit Aether. Beim Einengen des ätherischen Auszuges krystallisirt das freie Carbizin in langen Nadeln aus, welche leicht in Chloroform und Alkohol löslich sind. Zur Analyse wurde ein nochmals aus Alkohol ausgeschiedenes Präparat von blättriger Struktur verwandt. Sein Schmelzpunkt liegt genau bei 78°.

0,1138 gr gaben 0,1380 BaSO₄ bei der Oxydation mit Bromwasser und BaCl₂.

0,1392 gr gaben 18,25 cbm N bei 20° und 753 mm Druck.

Berechnet für:



16,67%

14,58%

S

N

Gefunden:

16,65%

14,85%.

Man hat bei der Reaktion Sorge zu tragen, dafs die optimale Temperatur von 130–140° nicht überschritten wird, da das Carbizin beim höheren Erhitzen, unter Zerfall des Moleküls, Schwefelwasserstoff entläßt.


Setzt man zur konzentrirten Lösung des salzsauren Carbizins Alkalilaugen, so trübt sich die Lösung und setzt milchige, dicke Niederschläge ab, die wahrscheinlich aus den betreffenden Alkalisalzen von der Formel



wo x ein einwerthiges Metall bedeutet, bestehen. Sie lassen sich indessen nicht isoliren, resp. reinigen, da sie sich schon

in wässriger Lösung wieder in ihre Componenten spalten; sie wurden deshalb nicht weiter untersucht.

Phenylpseudocumylthiosemicarbazid.



Zu einem Molekül trocknen Pseudocumylhydrazin läßt man allmählich die berechnete Menge (1 Mol.) Phenylsenföl fließen. Die beiden Körper addiren sich sofort zu einander, wenngleich weniger heftig, als bei der Phenylcyanatverbindung:



Sobald alles Phenylsenföl zugesetzt ist, vollendet man die Reaktion durch Erhitzen über der offenen Flamme, bis die ganze Masse geschmolzen ist. Die amorphe Schmelze zieht man wiederholt mit siedendem Alkohol aus. Beim Erkalten der Lösungen scheidet sich das Thiosemicarbazid in langen, um ein Zentrum angeordneten Nadeln aus, welche sich an der Luft erst rosa färben, später wieder fast weiß werden. Sie schmelzen bei 170°.

Die Verbindung ist sehr beständig, Fehling's Lösung wird nicht, auch nicht bei anhaltendem Kochen, verändert. Von verdünnten Alkalien wird sie ebenso wenig angegriffen, wie von verdünnten Säuren. Hingegen scheidet sie aus frisch gefälltem Quecksilberoxyd, in Aether suspendirt, und aus ammoniakalischer Silberoxydlösung die Metalle ab. Sie ist

leicht löslich in Schwefelkohlenstoff, Benzol, Chloroform, Aceton, Aether, Ligroïn, schwerer in Alkohol.

0,2402 gr gaben 0,5918 CO_2 und 0,1460 H_2O .

0,1752 gr gaben 0,1435 BaSO_4 bei der Oxydation mit Bromwasser und BaCl_2 .

0,1348 gr gaben $17\frac{1}{2}$ cbm N bei 19° und 768 mm Druck.

Berechnet für:

$\text{C}_{16}\text{H}_{19}\text{N}_3\text{S}$

67,37 %

6,66 %

11,23 %

14,74 %

100,00 %

C

H

S

N

Gefunden:

67,20 %

6,74 %

11,24 %

15,05 %

100,23 %



IX.

**Einwirkung von Bromäthyl auf
Pseudocumylhydrazin.**

Ein Bromalkyl kann bei Einwirkung auf ein Hydrazin seinen Alkylrest gegen Wasserstoff austauschen, während der dabei gebildete Bromwasserstoff gleichzeitig zur Salzbildung verwandt wird. Der Alkylrest kann entweder ein Amidwasserstoffatom vertreten, dann entstehen Salze symmetrischer, sekundärer Hydrazine; oder er vertritt den Wasserstoff des Stickstoffatoms, an welchen schon der aromatische Rest gebunden ist, dann entstehen die Salze der unsymmetrischen, sekundären Hydrazine.

Auf letztere Verbindungen kann nun von Neuem Bromalkyl einwirken, und zwar geschieht das unter direkter Addition zum Bromid einer Azoniumbase. Auch auf erstere, die symmetrischen, sogenannten Hydrazoverbindungen, kann Bromalkyl von Neuem einwirken: es entstehen höher alkylierte Hydrazine.

Ich hatte die Absicht, ein unsymmetrisches, sekundäres Alkylpseudocumylhydrazin darzustellen, mit welchem ich einige ähnliche Condensationen, wie mit der primären Base, auszuführen gedachte. Leider wurden meine Erwartungen getäuscht. Keine von den angewandten Darstellungsmethoden führte zu einem Ziele; das angewandte Hydrazin blieb stets im Wesentlichen unverändert. Spezieller untersucht wurde das Einwirkungsprodukt von Bromäthyl.

Bromäthyl und Pseudocumylhydrazin.

Unter gewöhnlichen Umständen wirkt Bromäthyl weder auf die Lösung des Hydrazins, noch auf die trockne Base ein. Selbst nach tagelangem Erhitzen der ätherischen Lösung am Rückflusskühler unter einem Ueberdruck von 400 bis 500 mm Quecksilbersäule zeigten sich beide Agentien noch vollständig unverändert. Eine Reaktion wird erst eingeleitet, sobald man höhere Temperatur und Druck zu Hülfe nimmt. Zu dem Ende bringt man das feste, möglichst gut abgepresste Hydrazin in ein dickes Glasschmelzrohr. Nachdem reichlich $\frac{5}{4}$ Moleküle Bromäthyl zugefügt, schmilzt man eine dickwandige Capillare an und erhitzt im Bombenofen allmählich auf 105–115°. Nach 18–20 stündiger Einwirkung kann man, wie zahlreiche Versuche bewiesen, die Reaktion als vollendet betrachten.

Der Inhalt des Rohres theilt sich beim Abkühlen in drei Schichten, deren untere aus freiem primärem Hydrazin, resp. dessen bromwasserstoffsäuren Salzen besteht; die mittlere bildet ein dunkelbraunes Oel, welches die Einwirkungsprodukte enthält, und die obere Schicht ist wesentlich überschüssiges Bromäthyl. Nachdem man letztere Schicht abgegossen hat und zur vollständigeren Vertreibung des Bromäthyls kurze Zeit auf etwa 60° erhitzt hat, zieht man den Rest des Rohrinhaltes wiederholt mit Aether am Rückflusskühler aus. Dabei geht alle freie Base in Lösung, während der Rückstand nunmehr nur noch aus bromwasserstoffsäuren Salzen besteht. Am reichlichsten sind die Ausbeuten an diesen Salzen bei einer Beschickung des Rohres mit 32 gr freiem Pseudocumylhydrazin und 30 gr Bromäthyl (1 Mol. auf reichlich $\frac{5}{4}$ Mol.).

Die Trennung dieser Salze ist ziemlich schwierig, sie gelingt am besten durch Behandlung derselben mit Chloroform oder Benzol. In diesen Beiden sind nämlich die Salze

der sekundären Hydrazine löslich, während diejenigen der primären Hydrazine so gut wie unlöslich sind.

Man fällt die wässrige Lösung der bromwasserstoffsauren Salze zum größten Theil mit Natronlauge, neutralisirt vorsichtig mit kohlensaurem Natron und extrahirt mit Aether. Den ätherischen Auszug wäscht man mit Wasser, setzt reichlich Benzol zu und dampft schliesslich den Aether möglichst vollständig ab. Nun leitet man gasförmige, trockene Salzsäure ein bis die Flüssigkeit stark raucht. Es bildet sich allmählich ein Niederschlag von salzsaurem primärem Hydrazin, während das salzsaure Salz des sekundären Hydrazins in Lösung bleibt. Beim Verdunsten des Filtrats scheiden sich stark grün gefärbte Krystalle des Salzes der sekundären Base ab. Dieselben werden nochmals mit absolutem Benzol behandelt, und die klare Lösung recht langsam verdunstet. Die nun auskrystallisirte Masse wird in Wasser aufgenommen und längere Zeit mit Thierkohle gekocht. Man erhält dann aus der konzentrirten Lösung ein Produkt von vorzüglicher Reinheit. Es bildet klare, gelbe, schiefe Prismen, welche bei 133° unzersetzt zu einem gelben Oele schmelzen. Das Salz ist sehr leicht löslich in Chloroform, Benzol, Alkohol und besonders in Wasser, weshalb man beim Umkrystallisiren aus letzterem grofse Verluste hat.

Ein aus Wasser krystallisirtes Präparat zeigte bei den Analysen folgende Werthe:

0,1956 gr gaben 0,4410 CO_2 und 0,1566 H_2O .

0,3016 gr gaben $35\frac{1}{2}$ cbm N bei 22° und 764 mm Druck.

0,3612 gr gaben 0,2450 AgCl bei der Verbrennung mit CaO und AgNO_3 .

Berechnet für:


$\text{C}_9\text{H}_{11}\text{C}_2\text{H}_5\text{N}_2\text{H}_2\text{HCl}$

Gefunden:

61,54 %	C	61,45 %
8,86 %	H	8,89 %
13,05 %	N	13,40 %
16,55 %	Cl	16,77 %
100,00 %		100,51 %


Beim Zusatz von Aetzalkalien zur wässerigen Lösung des salzsauren Salzes fällt die freie Base als gelatinöser Niederschlag aus; derselbe wird mit Aether aufgenommen und abgehoben. Die Lösung ist blutroth, das Hydrazin wird mit Wasser pulverförmig ausgefällt. Es ist leicht löslich in Alkohol, aus welchem es in dünnen Nadeln krystallisirt. Der Schmelzpunkt liegt bei 47°.

Das freie Hydrazin scheint sich an der Luft langsam zu zersetzen; die anfangs farblosen Krystalle werden erst roth, später schmutzig braun. Es reduzirt ammoniakalische Silberoxydlösung und Fehling's Lösung schon bei gewöhnlicher Temperatur. Aus diesem Grunde und auch deshalb, weil es mit keinem Aldehyd und Keton eine Condensation eingeht, ist es nicht unwahrscheinlich, dafs das Hydrazin symmetrisch ist, also folgende Constitutionsformel hat:



0,1004 gr gaben 14,2 cbm N bei 20° und 756 mm Druck.

Berechnet für:



15,73%

N

Gefunden:

16,09%.



